



Пресс-релиз

**16 февраля – День профилактики инфекций,
передающихся половым путем**



Инфекции, передающиеся половым путем (далее ИППП) остаются одной из важнейших социальных и медицинских проблем в мире.

В Республике Беларусь ежегодно регистрируется около 30 тысяч случаев заражения ИППП, из них в Гомельской области – 4,9

тысяч, причем социально-опасные заболевания, такие как сифилис и гонорея, составляют из них около 7%.

Раннее начало половой жизни, случайные половые связи, частая смена половых партнеров, игнорирование средств индивидуальной профилактики, злоупотребление спиртными напитками, бесконтрольное применение антибактериальных препаратов и самолечение являются факторами риска заражения половыми инфекциями.

При заражении ИППП не всегда и не сразу появляется клиническая симптоматика. Каждая инфекция из этой группы имеет свою продолжительность «скрытого периода» (инкубации), в течение которого нет никаких жалоб и симптомов, и заразившийся продолжает быть сексуально активным, т.е. ведет привычный образ жизни и служит источником инфекции для своего полового партнера.

Отсутствие лечения либо самолечение приводит к развитию хронического течения болезни, поражению органов мочеполовой сферы, суставов, глаз, чревато развитием бесплодия, осложнениями беременности, а у мужчин – нарушениями эректильной функции и развитием импотенции. Самоизлечение – это миф!

Одной из наиболее опасных ИППП является сифилис. Если ее не лечить, то финал однозначный – инвалидность. Сифилис разрушает нервную ткань головного и спинного мозга, поражает жизненно важные органы.

Что важно знать об ИППП?

- Применение противозачаточных таблеток не спасает от заражения ИППП.
- Прерванный половой акт не защищает от ИППП.
- Ты можешь не знать, что заразился ИППП в течение многих месяцев.

- Неприятные ощущения и симптомы ИППП могут исчезнуть без лечения, а болезнь останется, и ты можешь заражать других людей.

- При своевременном обращении большинство ИППП поддаются эффективному лечению.

- Венерические болезни передаются и плоду внутриутробно, и через материнское молоко, и при переливании крови. Эти микробы, попадая в организм, способны через кровь, лимфу, на сперматозоидах и т.п. поражать самые разные органы и даже захватывать организм полностью.

Помните! Основа профилактики заражения ИППП – это верность своему половому партнеру, информированность в вопросах безопасного полового поведения, а также использование средств индивидуальной защиты (презерватив). В игре под названием «ИППП» нет победителей, есть только проигравшие!

***16 февраля с 10.00 до 12.00 по вопросам профилактики ИППП
будет работать «горячая» телефонная линия 8 (0232) 43 46 56.***

***На вопросы ответит заместитель главного врача Гомельского
областного клинического кожно-венерологического диспансера
врач-дерматовенеролог Янко Наталья Борисовна.***

*Информацию по вопросам обследования и лабораторной
диагностики ИППП ежедневно с 8 до 16 часов можно получить
по тел. 8 (0232) 75 69 16 у специалистов лаборатории
диагностики вирусных и особо опасных инфекций
Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ.*

*Консультации по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД – ежедневно
с 8 до 16 часов по тел. 8 (0232) 75-71-40.*

Вячеслав Каливо,
главный государственный
санитарный врач района